






# ¿EL CONSUMO DE OPIOIDES LE CAUSA PROBLEMAS?

La buprenorfina y la metadona detienen los síntomas de abstinencia y los deseos de consumir, y reducen eficazmente el consumo de opioides ilícitos.

	<b>BUPRENORFINA</b>	<b>METADONA</b>
 <b>¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR?</b>	Entre 12 a 24 horas después del último uso de opioides	Inmediatamente
 <b>¿CÓMO LA TOMO?</b>	Disuelva una tira o pastilla en la boca una vez al día. Puede recibir una receta para empezar en casa sin tener que ir primero a una clínica.	Tome una dosis al día en los programas aprobados. Por lo general, hay que ir en persona para recibir la dosis, pero puede permitirse alguna dosis para llevar a casa.
 <b>¿POR CUÁNTO TIEMPO DEBO TOMARLA?*</b>	Es más eficaz si se usa por más de 9 meses.	Es más eficaz si se usa por lo menos 1 año.
 <b>¿CÓMO LA CONSIGO?</b>	<b>LLAME AL 833-234-6343</b> y pregunte por <b>MAR NOW</b> (medication assisted recovery now). Todos los habitantes de Illinois son elegibles.	
 <b>¿NECESITO UN SEGURO?</b>	No. A través del programa <b>MAR NOW</b> , cualquier persona puede acceder a estos medicamentos con o sin seguro. Solo tiene que <b>LLAMAR AL 833-234-6343</b> para empezar.	

\*La decisión sobre la duración final del tratamiento depende de la persona y de su proveedor de atención médica

