



¿QUÉ ES EL MEDICAMENTO DOXY-PEP CONTRA LAS INFECCIONES DE TRANSMISSION SEXUAL (ITS)?

La doxiciclina es una manera efectiva y nueva de prevenir cualquier bacteria causada por ITS. Al tomar el medicamento de doxiciclina en un periodo de 24 horas y no mayor a 72 horas, después de haber tenido contacto sexual sin condón de manera oral, anal, o vaginal, los pacientes pueden reducir el riesgo de adquirir ITS.



¿QUÉ TAN EFECTIVA ES DOXY-PEP CONTRA ITS?

Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicado en abril del 2023 en un diario de medicina de Inglaterra, encontró que la doxy-PEP logró reducir la sífilis en un 87%, y gonorrea en un 55% en individuos que tomaron PrEP VIH. Además la doxy-PEP redujo sífilis en un 77%, clamidia en un 74%, y gonorrea en un 57% en personas que tienen VIH. (Fuente: N Engl J Med 2023; 388:1296 1306)



¿CUALQUIERA PUEDE USAR DOXY-PEP COMO TRATAMIENTO A ITS?

Los datos revelan que únicamente aplica a adultos que son homosexuales, bisexuales, y hombres que tienen sexo con hombres (GBMSM), así como mujeres transgénero. Los estudios en mujeres cisgénero y en adolescentes están en curso.



Para más información visite:
chi.gov/DoxyPep



LA DOXY-PEP COMO TRATAMIENTO A ITS



¿QUÉ TAN EFECTIVA ES DOXY-PEP CONTRA ITS?

- La doxiciclina es una píldora que está disponible únicamente por prescripción.
- Es ideal tomar 200 mg. de doxiciclina en un periodo de 24 horas pero no mayor a 72 horas después de haber tenido sexo oral, anal, o vaginal sin protección.
- La doxiciclina se puede tomar a diario, dependiendo de la frecuencia de la actividad sexual, pero las personas no deben de tomar más de 200 mg. en un periodo de 24 horas.
- Hiclato de doxiciclina de liberación retardada (1 tableta o 200 mg.) o hiclato de doxiciclina o monohidrato de liberación inmediata de 100 mg. (2 tabletas ingeridas simultáneamente) es aceptable.



¿QUÉ NECESITO SABER SOBRE LA DOXICICLINA?

Los pacientes que utilicen la doxy-PEP contra ITS deberán de mantener una rutina de regular de prueba para mantener su salud sexual, incluyendo pruebas cada 3 meses para la gonorrea, clamidia, sífilis, y VIH (si no sabe que tiene VIH) Si la persona que está usando doxy-PEP es diagnosticada con ITS, deberán de ser tratados de acuerdo a las guías establecidas por 2021 CDC STI.



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS POR DOXICICLINA?

Algunos de los efectos secundarios incluyen:

- Fototoxicidad
- Síntomas gastrointestinales
- Úlceras esofágica (raramente)



¿CÓMO PUEDO CONCIENTIZAR SOBRE DOXY-PEP CONTRA ITS?

Es conocida como un medicamento que tiene varios años, sin embargo se le considera como una nueva intervención. Organizadores comunitarios, proveedores, y DIS necesitan que tomar una perspectiva proactiva para informar a pacientes sobre la doxy-PEP contra ITS. Considere una campaña de concientización a miembros comunitarios, socios comunitarios, para construir concientización entre la población, además de considerar el trabajar con proveedores y farmacias que pueden informar sobre el medicamento y así vencer cualquier barrera.