

# Karta informacyjna na temat fentanylu

- Fentanyl to opioid **50 razy silniejszy od heroiny**.
- Nielegalnie wytwarzany fentanyl ma postać **białego/szarego proszku**, który można wstrzykiwać, palić lub wciągać.
- Fentanyl znajduje się w metamfetaminie, kokainie, heroinie i innych pigułkach.
- **W przypadku przedawkowania fentanylu do odwrócenia skutków przedawkowania potrzebna jest większa dawka naloksonu (Narcan).**
  - Fentanyl **NIE** jest odporny na działanie naloksonu (Narcan).
  - **NIE MOŻNA** przedawkować od samego dotknięcia fentanylu.
  - Jeśli pierwsza dawka naloksonu nie spowoduje ustąpienia objawów przedawkowania w ciągu 2–3 minut, podaj drugą dawkę.
- **Aby zmniejszyć ryzyko przedawkowania:** używaj narkotyków powoli, w mniejszych ilościach i rozłóż dawki w czasie. Zażywaj w obecności innej osoby i zawsze miej pod ręką nalokson (Narcan).
- **Objawy przedawkowania obejmują:** powolny, płytki oddech, dławienie się, zwiotczenie ciała, bladą/niebiską/zimną skórę, zasypianie lub utratę przytomności oraz mocno zwężone źrenice.  
**Zadzwoń pod numer 911, jeśli sądzisz, że ktoś przedawkował**



Zadzwoń na infolinię Illinois Opioid Helpline:  
**1-833-2-FINDHELP**